

Bonnes pratiques dans le cadre du manioc

** A la création de la plantation :*

- ◆ Observer une période de mise en jachère
- ◆ Laisser le bétail venir se nourrir sur la parcelle mise en jachère.
- ◆ Ne pas pratiquer la culture sur brulis pour le manioc.
- ◆ Effectuer un reboisement avec les grands arbres.
- ◆ Planter des espèces qui fertilisent le sol comme l'arachide, le soja, le haricot.

Dans le champ de manioc :

- ◆ Éviter les plantes qui entrent en compétition avec le manioc dans la recherche des nutriments (banane, maïs, taro, tomate, igname, piment).
- ◆ Associer au manioc les plantes qui enrichissent le sol en azote tels que l'arachide et le soja.
- ◆ Avoir recourt au compostage des résidus d'origine organiques pour produire du bio-engrais.
- ◆ Promouvoir l'utilisation de méthodes naturelles de lutte insecticides et fongicides pour protéger le manioc contre les ravageurs à travers des préparations à base de piment, Fleur Marguerite, Tabac, ail.

CSRS
Centre Suisse de Recherches
Scientifiques en Côte d'Ivoire



Man & Nature



ACB-CI

CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



Proposent

Les Bonnes pratiques agricoles pour la culture du manioc, du palmier à huile et du cacao dans l'espace FMTE

Bonnes pratiques dans le cadre du cacao

- ◆ Lors de la création d'une nouvelle plantation, une culture vivrière du type bananier doit accompagner les jeunes plants de cacaoyers.
- ◆ Laisser dans la plantation les arbres d'ombrage puisant leur eau dans les couches profondes du sol.
- ◆ Planter si nécessaire les arbres capables d'attirer et d'héberger des insectes pollinisateurs des cacaoyers, des fourmis rouges susceptibles de neutraliser les mirides, punaises et autres insectes nuisibles. Le colatier et d'autres arbres fruitiers sont conseillés.

- ◆ Enlever toutes les cabosses noires, rongées et ou attaquées par les insectes nuisibles.
- ◆ Fabriquer du compost avec des résidus de cabosses mélangées avec d'autres débris végétaux ou animaux.

Bonnes pratiques dans le cadre du Palmier à huile

- ◆ Planter de grands arbres dans les palmeraies.
- ◆ Pour la création de nouvelles plantations, éviter l'abattage systématique des grands arbres.
- ◆ Laisser le bétail venir se nourrir sur la parcelle mise en jachère
- ◆ Avoir recourt au compostage pour la production de fertilisant biologique.

- ◆ Pour la mise en place de la parcelle, choisir un sol profond et meuble (sable). Sur des sols non adaptés, il faut réduire le nombre de pieds à l'hectare passer de 300 à 200 pieds .
- ◆ Préconiser la lutte mécanique: couper les rameaux ou les pieds atteints par les maladies et les insectes ravageurs.
- ◆ Réduire l'exportation des déchets organiques sur des sols pauvres.
- ◆ En cas d'excès de fertilisation potassique sur sols pauvres en magnésium, il convient donc d'arrêter l'apport en engrais minéral et faire un compostage riche en magnésium